

水優[®] 低納發泡錠

衛署藥製字第 046311 號
醫師藥師藥劑生指示藥品

NuDrink (low Sodium Effervescent Tablets)

葡萄糖和電解質補充劑

NuDrink是葡萄糖與電解質的複合製劑，此發泡錠溶於水後會產生芳香氣味，在大多數由腹瀉或流汗過度引起的輕度和中度脫水情況時，依照醫師的指示服用本劑可以補充體液和電解質的缺乏。

【有效成分及含量】每錠含Glucose anhydrous 3027mg

【其他成分(賦形劑)】Riboflavin(Vit. B2)、Saccharin sodium、Citric acid anhydrous、Sodium bicarbonate、Lemon flavour、Orange powder、Sodium chloride、Potassium chloride、Sunset yellow FCF。

【用途(適應症)】用以治療伴有腹瀉或流汗過度的體液及電解質缺乏。主要適用於早期輕度及中度脫水。

【使用上注意事項】

1. 有下列情形者，請勿使用：

- (1) 腎功能不全的人，特別是無尿排出(無尿症)的人。
- (2) 葡萄糖吸收不良(單糖類吸收不良)的人。
- (3) 失去知覺、休克、持續的嘔吐及血液中基本物質濃度過高(代謝性鹼中毒)的人。
- (4) 曾因本藥成分引起過敏的人。

2. 有下列情形者，使用前請洽醫生診治：

- (1) 糖尿病患者。
- (2) 患有心衰竭或高血壓的人。
- (3) 當NuDrink作為注射流體療法的輔助劑時，使用量應注意勿超過病人水及電解質的需要量。

3. 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (1) 哺乳婦女，於服用NuDrink期間可以繼續哺乳嬰兒。

4. 其他使用上注意事項：

- (1) 本劑不可與果汁、牛奶或其他含有電解質(礦泉水)的溶液混合使用，因為會改變鹽類及葡萄糖的濃度而影響吸收。
- (2) 為避免因服用過量而引起併發症(伴隨足夠水份的高鉀血症及高鈉血症)，製備藥液時必須依照指示使用水量。
- (3) 過量的攝取流體可能會引起眼瞼腫大，雖然這種現象是無害的，但口服的流體治療須停止，直到此現象消失。
- (4) 加藥片的溶液不可再煮沸，須每天新鮮裝備。
- (5) 任何用剩的溶液必須丟棄。
- (6) 避免誤用，為保持品質，不要換裝到其他容器。
- (7) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (8) 避免陽光直射。
- (9) 勿超過建議使用量。
- (10) 大部分的病人服用NuDrink沒有任何問題。但是，若病人拒絕飲用或停留於昏睡狀態，則本劑可以用鼻胃輸液的方式投與。

【用法用量】

用 法	用 量
1. 此發泡錠須溶於飲用水或事先煮沸已冷卻的水中。 2. 溶1錠於 120 ml水(嬰兒瓶的容量)或溶2錠於 240 ml水(大玻璃杯的容量)。 3. 嬰兒及小孩服用NuDrink需投與 6-12小時(最多24小時)，而學齡兒童及成人則繼續投與直到腹瀉停止。	每次腹瀉服用1-2杯NuDrink溶液(2錠溶於240~480ml水中)或依照病人能接受多少就給多少。 輕度脫水： 每2小時腹瀉不超過1次時劑量100ml/kg/day直到腹瀉停止(如，每次腹瀉使用一錠)。 中度脫水： 每2小時腹瀉超過1次時劑量10-15ml/kg/hour直到腹瀉減輕(如，每小時使用一錠或病人能接受多少就給多少)。

【警語】

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有任何不適情況產生。
- (2) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】2-1000粒塑膠管裝。

【儲存】25°C以下，避熱防濕。

委託者



BEST PHARMA CO. LTD.
倍斯特醫藥生物科技股份有限公司

總公司：台中市北屯區崇德路二段51號3樓之3、之5

製造廠：歐帕生技醫藥股份有限公司

廠址：新竹縣湖口鄉光復路1號