



康護寧® 消炎噴液劑 1.5毫克/毫升 衛署藥製字第045922號
Comffam Anti-inflammatory Spray 1.5mg/ml



【有效成分及含量】 Benzydamine hydrochloride 1.5毫克/毫升

【其他成分(賦形劑)】 Tween 80、Brilliant blue FCF、Glycerin、Tartrazine、Methyl paraben、Propyl paraben、Peppermint oil、Clove oil、Alcohol。

【用途(適應症)】 舒緩口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情況者，請勿使用：曾經因本類藥物引起過敏症狀者。
- 二、有下列情況者，請洽醫師診治：(一) 6歲以下兒童。(二) 有肝腎疾病的人。
- 三、有下列情況者，使用前請先諮詢醫師藥劑師：
 - (一) 孕婦，可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二) 正在使用其他藥品者(包含非處方藥)。雖然目前尚無已知與其有交互作用之藥品。
- 四、其它使用上注意事項：
 - (一) 勿超過建議用量。
 - (二) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (三) 使用時請勿接近眼睛，若不小心接觸到眼睛，請立即以大量清水清洗。
 - (四) 連續使用不應超過7天。

【用法用量】

成人及12歲以上兒童	噴液劑每次噴4~8下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5~3小時使用一次
6歲至12歲兒童	噴液劑每次噴4下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5~3小時使用一次。
6歲以下兒童	請洽醫師診治

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑師。

身體部位	副作用
消化系統	麻木、灼熱、刺痛、口乾或口渴、噁心、嘔吐、胃腸不適
神經系統	頭昏、頭痛、嗜睡。

- 二、服用本藥後，若有以下症狀時，請立即停用，並接受醫師診治：
- (一) 全身過敏性反應，如皮膚癢疹，蕁麻疹，光過敏性皮膚炎，呼吸困難，喉嚨痙攣，支氣管痙攣。
 - (二) 若有上述外之其他不適情況產生。
 - (三) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

- 【包裝】 100毫升以下之玻璃瓶裝
【類別】 醫師藥劑師指示藥品
【儲存】 25℃以下儲存



製造廠： 旭能醫藥生技股份有限公司
苗栗縣竹南鎮科研路25號
委託者： **BEST PHARMA Co., Ltd.**
倍斯特醫藥生物科技股份有限公司
總公司：台中市北屯區崇德路二段51號3樓之3、之5



Comfflam® ANTI-INFLAMMATORY SPRAY 1.5mg/ml

【Active ingredient and content】 Benzydamine hydrochloride 1.5mg / ml

【Other ingredients (Excipient)】 Tween 80、Brilliant blue FCF、Glycerin、Tartrazine、Methyl paraben、Propyl paraben、Peppermint oil、Clove oil、Alcohol.

【Use(Indication)】 Spray into throat or onto affected area with several sprays per day for the relief of painful conditions of mouth and throat including tonsillitis, sore throat, radiation mucositis, aphthous ulcers, post orosurgical and periodontal procedures.

【Precautions】

1. Do not use for people having the following conditions: Who experienced an allergic reaction.
2. Please consult a doctor before use: (1) Under six years of age. (2) who have hepatic or renal diseases.
3. Please consult a doctor or pharmacist:
 - (1) Who are pregnant, wish to get pregnant, or are lactating (breastfeeding).
 - (2) Who are using other drugs (including prescription drugs), however there are currently no known drug-drug interaction.
4. Other precautions:
 - (1) Do not exceed the recommended dosage.
 - (2) Keep out of reach of children.
 - (3) In case get into the eyes, flush eyes with water immediately.
 - (4) Continuous use should not exceed 7 days.

【Administration and dosage】

Adult or over 12 years of age	4~8 sprays directly onto the sore or inflamed area. Repeat every 1.5 to 3 hours as necessary.
6 to 12 years of age	4 sprays directly onto the sore or inflamed area. Repeat every 1.5 to 3 hours as necessary.
Under 6 years of age	Please consult your doctor.

【Warnings】

1. If you notice any side effects, please consult a doctor or pharmacist with this insert.

Affected areas	Symptoms
Digestive system	Numbness, burning, irritating, dry mouth or thirst, nausea, vomiting, unpleasant feeling.
Nervous system	Dizziness, headache, drowsiness.

2. Please stop to use and consult a doctor immediately:

- (1) Systemic allergic reaction, skin pruritus, urticarial, photodermatitis, breathing difficulties, throat spasm, bronchospasm.
- (2) If any discomfort occurs.
- (3) If your symptoms don't improve or worsen.

【Package】 Glass bottle under 100 ml.

【Classification】 Instruction drug, instructed by physician, pharmacist or pharmacist assistant.

【Storage】 Store below 25°C.



Under the authority of
Best Medical Biotechnology Co., Ltd.
3F-3-5 No.51 Sec 2 Chung Der Road,
Tai-Chung, Taiwan, 406 R.O.C

9169120.03