



## 康護寧消炎噴液劑1.5公絲 / 公撮

## COMFFLAM ANTI-INFLAMMATORY SPRAY 1.5MG/ML

衛署藥製字 第 045922 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2024-08-20

## 1 成分

## 1.1 有效成分及含量

**Benzydamine hydrochloride 1.5毫克/毫升**

## 1.2 其他成分(賦形劑)

Tween 80、Brilliant blue FCF、Glycerin、Tartrazine、Methyl paraben、Propyl paraben、Peppermint oil、Clove oil、Alcohol。

## 2 用途(適應症)

舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。

## 3 使用上注意事項

## 3.1 有下列情形者，請勿使用

曾經因本類藥物引起過敏症狀者。

## 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 6歲以下兒童。

3.2.2 有肝腎疾病的人。

3.2.3 懷孕20週以上之孕婦。(請參見【警語】)

## 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦，可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在使用其他藥品者(包含非處方藥)。雖然目前尚無已知與其有交互作用之藥品。

3.3.3 懷孕未滿20週之孕婦及可能懷孕婦女。(請參見【警語】)

## 3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 勿超過建議用量。


3.4.2 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.3 使用時請勿接近眼睛，若不小心接觸到眼睛，請立即以大量清水清洗。

3.4.4 連續使用不應超過7天。

## 4 用法用量

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 成人或年齡大於12歲的小孩 | 直接噴液4~8次(1~2公絲)於疼痛紅腫部位後緩慢吞服。如有必要每1.5~3小時可重覆使用。 |
| 年齡6~12歲的小孩    | 直接噴液4次(1公絲)於疼痛紅腫部位後緩慢吞服。如有必要每1.5~3小時可          |



重複使用。

6歲以下孩童

不建議使用。

除非在醫師指示下，連續治療不應超過7天。

## 5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

| 身體部位 | 副作用                       |
|------|---------------------------|
| 消化系統 | 麻木、灼熱、刺痛、口乾或口渴、噁心、嘔吐、胃腸不適 |
| 神經系統 | 頭昏、頭痛、嗜睡。                 |

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 全身過敏性反應，如皮膚癢疹，蕁麻疹，光過敏性皮膚炎，呼吸困難，喉嚨痙攣，支氣管痙攣。

5.2.2 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.3 自覺狀況沒有改善或更惡化。

5.3 非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能會影響懷孕和/或胚胎/胎兒發育。用於懷孕30週以上之孕婦可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓；用於懷孕20週以上之孕婦可能導致胎兒腎臟功能不全、羊水過少，甚至新生兒腎臟損傷；在懷孕早期使用則可能提高流產、心臟畸形之風險，故請遵循以下建議：

5.3.1 懷孕30週以上之孕婦，應避免使用。

5.3.2 懷孕20至30週之孕婦，用藥前須經醫師確認有使用必要，並以最低有效劑量及最短期間治療；若治療時間超過48小時，可能需要以超音波監測羊水狀態。

5.3.3 懷孕未滿20週之孕婦及可能懷孕婦女，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。

## 6 包裝

100公撮以下塑膠瓶、玻璃瓶裝

## 7 儲存方式

25°C以下儲存

## 8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

## 製造廠

旭能醫藥生技股份有限公司

苗栗縣竹南鎮科研路25號

## 藥商

倍斯特醫藥生物科技股份有限公司

臺中市北屯區崇德路二段51號3樓之3、之5